

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДСКОЙ ГИМНАЗИИ

Вилова К.Г., Боева О.К., Вилова Т.В.

**Северный государственный медицинский университет,
г. Архангельск, Россия**

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности хронического рецидивирующего герпетического стоматита (ХРГС) у учащихся МОУ «Общеобразовательная гимназия № 6» г Архангельска. Было обследовано 254 учащихся гимназии в возрасте от 8 до 17 лет. Представленные результаты были получены при анализе анкетных и анамнестических данных и при стоматологическом обследовании этих детей. Нами предпринята попытка на основании собранных анамнестических сведений составить фрагмент «риск-программы» для прогнозирования ХРГС у школьников городской гимназии. Показатель распространенности ХРГС у школьников 8 – 17 лет находится в диапазоне высоких значений – от $58 \pm 0,1\%$ до $94 \pm 0,1\%$. Наибольший показатель распространенности отмечен нами в возрасте 12 лет – $94 \pm 0,1\%$. Общая продолжительность ХРГС более 5 лет в возрасте 8 лет зарегистрирована у $27 \pm 0,1\%$ детей, в 12-летнем возрасте – уже у $78 \pm 0,1\%$ учащихся. Остались высокими эти показатели также в возрасте 16 и 17 лет ($43 \pm 0,1$ и $73 \pm 0,1\%$, соответственно). Эти данные демонстрируют отсутствие улучшения состояния здоровья у школьников городской гимназии, позволяющее находиться вирусу простого герпеса в латентном состоянии в организме ребенка. Чаще всего ХРГС регистрируется в зимний ($49 \pm 0,1\%$) и осенний ($30 \pm 0,1\%$) периоды. Обращает на себя внимание, что особенно часто болеют осенью дети и подростки 12 и 17-летнего возраста ($37 \pm 0,1$ и $34 \pm 0,1\%$, соответственно). Это говорит о снижении иммунитета в отношении герпесвирусной инфекции у лиц данного возраста. Нами отмечено также, что у трети ($33 \pm 0,1\%$) и половины ($50 \pm 0,1\%$) обследованных в возрастных группах 8 и 17 лет растет число рецидивов герпеса до 3-4 раз в год. В возрасте 12 и 16 лет эти показатели отмечены только у $10 \pm 0,1\%$ и $25 \pm 0,1\%$ детей, соответственно. По нашему мнению, особое значение следует придавать сведениям о более тяжелом клиническом проявлении хронического герпеса у 8-летних школьников. Вызывает тревогу, что информированность учащихся о последствиях герпеса крайне низка в 8-летнем ($13 \pm 0,1 \%$) и 12-летнем возрасте ($18 \pm 0,1 \%$), незначительно выше в возрасте 16 лет ($25 \pm 0,1 \%$) и 17 лет ($36 \pm 0,1 \%$). Таким образом, проведенный анализ продемонстрировал, что распространенность ХРГС у школьников гимназии № 6 г. Архангельска высока. Наиболее уязвимы дети 8 и 12-летнего возраста. Часто рецидивирует герпес в возрасте 16 и 17 лет. Длительность рецидива герпеса велика в возрасте 8 и 12 лет. Детям с ХРГС следует проводить местное и общее иммунологическое обследование.