

## Пи-Теория фундаментальных физических констант: метрологические аспекты

© В.Б. Смоленский 2015

Аннотация: в мае месяце этого года будут опубликованы значения фундаментальных физических констант (ФФК), которые КОДАТА рекомендует для международного использования. В статье представлены предсказательные результаты оригинальных теоретических исследований автора по определению численных значений ФФК, полученные с помощью аналитического метода Пи-Теории фундаментальных физических констант. Приведены конечные формулы и высокоточные результаты аналитических расчетов. Представлена таблица сравнения результатов расчетов с данными CODATA 2010.

### Конечные формулы и итоговые результаты

Пи-Теория фундаментальных физических констант (далее – Пи-Теория) исходит из того, что физическая реальность представляет собой единую параметрическую пространственно-временную материальную среду (далее – Среда).

Пояснение: если обозначение параметра имеет нижний индекс “ $\pi$ ”, то это, во-первых, означает, что это параметр Пи-Теории, а во-вторых, что этот параметр имеет теоретическое значение, которое может использоваться вместо истинного значения параметра. Скалярный параметр – это числовой параметр. В Пи-Теории есть только один-единственный свободный параметр – скалярный параметр Среды  $r_{fr}$ . Все получаемые в Пи-Теории результаты являются решениями алгебраических уравнений.

**Таблица 1.** Представлены конечные формулы для определения значений безразмерных ФФК.

№	Наименование параметра и конечная формула Пи-Теории
1	Скалярный параметр Среды $r_{fr}$ (свободный параметр): $r_{fr} = \pi$ .
2	Скалярный параметр элементарного заряда $\alpha_{\pi 0}$ . Является действительным корнем уравнения $\varphi_{\pi 0}^3 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi 0} \cdot \bar{\beta}_{\pi} = (1 + \Delta y_{\pi 0} \cdot \alpha_{\pi 0})^3,$ в котором: $\varphi_{\pi 0} = \sqrt{2} \cdot \pi$ ; $\Delta y_{\pi 0} = \sqrt[4]{2 \cdot \pi}$ ; $\bar{\beta}_{\pi} = 1 + \bar{\beta}_{\pi 0}$ ; $\bar{\beta}_{\pi 0} = \alpha_{\pi 0} / \varphi_{\pi 0}$ .
3	Скалярный параметр структуры пространства – времени $f_{\pi s 0}$ : $f_{\pi s 0} = \alpha_{\pi 0} \cdot \bar{\beta}_{\pi}.$
4	Константа параметрического смещения $\Delta y_{\pi e}$ : $\Delta y_{\pi e} = \Delta_{\pi x} / \Delta y_{\pi 0}^3.$
5	Коэффициент $\Delta_{\pi x}$ . Определяется из уравнения $\frac{1}{\varphi_{\pi 0}} \cdot \alpha_{\pi x 1,2}^2 + \alpha_{\pi x 1,2} - \bar{\beta}_{\pi} = 0$ в виде $\Delta_{\pi x} = \alpha_{\pi x 1} / \alpha_{\pi x 2}$ .
6	Константа параметрической связи $\beta_{\pi e}$ : $\beta_{\pi e} = 1 + \beta_{\pi 0 e}; \beta_{\pi 0 e} = \bar{\beta}_{\pi 0} / \bar{\beta}_{\pi}^3.$
7	Скалярный параметр элементарного заряда $\alpha_{\pi e}$ . Действительный корень уравнения $\varphi_{\pi 0}^3 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi e} \cdot \beta_{\pi e} = (1 + \Delta y_{\pi e} \cdot \alpha_{\pi e})^3.$
8	Скалярный параметр структуры пространства – времени $f_{\pi s e}$ : $f_{\pi s e} = \alpha_{\pi e} \cdot \beta_{\pi e}.$
9	Скалярный параметр структуры пространства – времени $\vec{f}_{\pi s}$ : $\vec{f}_{\pi s} = \sqrt[4]{f_{\pi s 0} \cdot f_{\pi s e}^3}.$

- 10 Скалярный параметр структуры пространства – времени
- $f_{\pi s}$
- :

$$f_{\pi s} = \sqrt[3]{f_{\pi se}^4 / f_{\pi s0}} .$$

- 11 Коэффициент асимметрии
- $k_{\pi}$
- :

$$k_{\pi} = \sqrt[4]{\tilde{f}_{\pi s} / f_{\pi s}} .$$

- 12 Коэффициент абсолютной стабильности
- $k_{\pi st}$
- :

$$k_{\pi st} = k_{\pi}^9 .$$

- 13 Скалярный параметр элементарного заряда
- $\alpha_{\pi}$
- :

$$\alpha_{\pi} = \alpha_{\pi e} / k_{\pi} .$$

- 14 Константа параметрической связи
- $\beta_{\pi}$
- :

$$\beta_{\pi} = f_{\pi s} / \alpha_{\pi} .$$

- 15 Постоянная масштабной инвариантности
- $\psi_{\pi}$
- :

$$\psi_{\pi} = k_{\pi\psi} \cdot \psi_{\pi 0} ,$$

$$\text{где } k_{\pi\psi} = \frac{2 \cdot \alpha_{\pi}^6}{\sqrt{\pi} \cdot f_{\pi s}^6} , \psi_{\pi 0} = 4 \cdot \pi^6 \cdot f_{\pi s}^9 .$$

- 16 Константа параметрического смещения
- $\Delta y_{\pi}$
- . Определяется прямым расчетом из уравнения

$$\varphi_{\pi 0}^3 \cdot \pi^2 \cdot f_{\pi s} = (1 + \Delta y_{\pi} \cdot \alpha_{\pi})^3 .$$

- 17 Скалярный параметр сильного заряда
- $\alpha_{\pi s}$
- . Действительный корень уравнения

$$\varphi_{\pi 0}^3 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi s} \cdot \beta_{\pi} = (1 + \Delta y_{\pi} \cdot \alpha_{\pi s})^3 .$$

- 18 Коэффициент зарядовой асимметрии
- $k_{\pi q}$
- :

$$k_{\pi q} = \alpha_{\pi x} / \alpha_{\pi y} ,$$

где коэффициенты  $\alpha_{\pi x}$  и  $\alpha_{\pi y}$  являются действительными корнями уравнений

$$\varphi_{\pi 0}^3 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi x} \cdot \bar{\beta}_{\pi} = (1 + \Delta y_{\pi 0} \cdot \alpha_{\pi x})^3 \text{ и } \varphi_{\pi 0}^3 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi y} \cdot \beta_{\pi e} = (1 + \Delta y_{\pi e} \cdot \alpha_{\pi y})^3 \text{ соответственно.}$$

- 19 Аномалия магнитного момента
- $a_{\pi ex}$
- . Определяется прямым расчетом из уравнения

$$(1 + \Delta y_{\pi e} \cdot \alpha_{\pi e})^3 = k_{\pi q}^4 \cdot (1 + \Delta y_{\pi e} \cdot a_{\pi ex})^3 .$$

- 20 Электромагнитная константа асимметрии
- $\Delta_{\pi a}$
- :

$$\Delta_{\pi a} = \alpha_{\pi e} - a_{\pi ex} .$$

- 21 Аномалия магнитного момента электрона
- $a_{\pi e}$
- :

$$a_{\pi e} = \alpha_{\pi} - \Delta_{\pi a} .$$

- 22 Аномалия магнитного момента
- $a_{\pi \mu x}$
- :

$$a_{\pi \mu x} = \frac{f_{\pi se}^3}{a_{\pi ex}^2} .$$

- 23 Аномалия магнитного момента мюона
- $a_{\pi \mu}$
- :

$$a_{\pi \mu} = a_{\pi \mu x} \cdot \left( \sqrt[4]{(1 + \Delta y_{\pi} \cdot \alpha_{\pi})^3} \right)^3 \cdot k_{\pi}^4 .$$

- 24 Коэффициент электрослабой асимметрии
- $k_{\pi w}$
- :

$$k_{\pi w} = k_{\pi} \cdot \left( \frac{1 + f_{\pi se}}{1 + f_{\pi s}} \right)^2 \cdot \left[ 1 + \left( -\frac{(\pi - 1)^2}{\pi} \right)^4 \cdot \frac{4}{\varphi_{\pi 0}} \cdot f_{\pi s}^4 \right] .$$

№	Наименование параметра и конечная формула Пи-Теории
25	Скалярный параметр слабого заряда $\alpha_{\pi w}$ : $\alpha_{\pi w} = k_{\pi w}^3 - 1.$
26	Отношение масс электрона и протона $r_{\text{пер}}$ : $r_{\text{пер}} = \left[ \frac{f_{\pi s} \cdot (1 + \Delta y_{\pi} \cdot \alpha_{\pi})^3}{\sqrt[3]{\pi^2}} \right] \cdot \left( 1 - \frac{\alpha_{\pi}}{\alpha_{\pi s}} \right) \cdot k_{\pi st}.$
27	Отношение масс электрона и нейтрона $r_{\text{пен}}$ : $r_{\text{пен}} = \left[ \frac{f_{\pi s} \cdot (1 + \Delta y_{\pi} \cdot \alpha_{\pi})^3}{\sqrt[3]{\pi^2}} \right] \cdot \left( \frac{a_{\pi e} + \alpha_{\pi w}}{a_{\pi e} + \Delta_{\pi a}} \right).$
28	Отношение масс нейтрона и протона $r_{\text{ппр}}$ : $r_{\text{ппр}} = \left( 1 - \frac{\alpha_{\pi}}{\alpha_{\pi s}} \right) \cdot \left( \frac{a_{\pi e} + \Delta_{\pi a}}{a_{\pi e} + \alpha_{\pi w}} \right) \cdot k_{\pi st}.$
29	Отношение магнитных моментов протона и нейтрона $r_{\pi\mu, \text{pn}}$ : $r_{\pi\mu, \text{pn}} = \left[ -\frac{(\pi - 1)^2}{\pi} \right] \cdot \frac{(1 + \alpha_{\pi w})^2}{(1 + \Delta_{\pi a})^2}.$

**Таблица 2.** Представлены результаты теоретических расчетов безразмерных ФФК.

№	Наименование параметра	Символ	Числовое значение
1	скалярный параметр Среды	$p_{\text{fr}}$	3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 2795
2	скалярный параметр структуры пространства – времени	$f_{\pi s}$	1,161 712 977 019 596 928 970 254 553 1147 x 10 <sup>-3</sup>
3	коэффициент асимметрии	$k_{\pi}$	1,000 000 081 371 686 023 215 889 742 3969
4	скалярный параметр элементарного заряда	$\alpha_{\pi}$	1,161 409 733 400 893 939 488 207 988 0708 x 10 <sup>-3</sup>
5	константа параметрической связи	$\beta_{\pi}$	1,000 261 099 601 615 200 373 179 794 6737
6	коэффициент электрослабой асимметрии	$k_{\pi w}$	1,000 000 081 810 773 063 436 894 140 0978
7	скалярный параметр слабого заряда	$\alpha_{\pi w}$	2,454 323 392 693 189 976 915 245 746 5274 x 10 <sup>-7</sup>
8	коэффициент абсолютной стабильности	$k_{\pi st}$	1,000 000 732 345 412 577 634 571 480 525
9	скалярный параметр сильного заряда	$\alpha_{\pi s}$	1,571 115 208 075 978 141 954 476 726 012 x 10 <sup>1</sup>
10	отношение масс электрона и протона	$r_{\text{пер}}$	5,446 170 218 699 090 667 403 109 649 777 x 10 <sup>-4</sup>
11	электромагнитная константа асимметрии	$\Delta_{\pi a}$	1,757 552 613 321 940 865 158 064 577 x 10 <sup>-6</sup>
12	аномалия магнитного момента электрона	$a_{\pi e}$	1,159 652 180 787 571 998 623 049 923 493 x 10 <sup>-3</sup>
13	аномалия магнитного момента мюона	$a_{\pi\mu}$	1,165 920 932 325 338 116 640 429 308 749 x 10 <sup>-3</sup>
14	отношение масс электрона и нейтрона	$r_{\text{пен}}$	5,438 673 445 786 830 889 662 641 220 105 x 10 <sup>-4</sup>
15	отношение масс нейтрона и протона	$r_{\text{ппр}}$	1,001 378 419 386 085 276 312 923 899 0331
16	отношение магнитных моментов протона и нейтрона	$r_{\pi\mu, \text{pn}}$	-1,459 898 124 622 977 783 495 815 120
17	постоянная масштабной инвариантности	$\psi_{\pi}$	1,669 642 831 928 813 892 580 472 151 077 x 10 <sup>-23</sup>

**Таблица 3.** Представлены расчетные формулы для определения значений размерных ФФК.

№	Наименование параметра	Символ	Расчетная формула	Ед. СГС
1	длина волны Комптона*	$\lambda_{\pi C0}$	$\lambda_{\pi C0} = 2 \cdot \sqrt{\frac{\psi_{\pi}}{f_{\pi s}}} \cdot l_{\pi u}$	см
2	постоянная Ридберга	$R_{\pi \infty 0}$	$R_{\pi \infty 0} = \frac{2 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi}^2}{\lambda_{\pi C0}}$	см <sup>-1</sup>
Коэффициент согласования констант $R_{\pi \infty 0}$ и $R_{\infty}$ (CODATA)		$\kappa_{\pi R}$	$\kappa_{\pi R} = \frac{R_{\pi \infty 0}}{R_{\infty}}$	-
3	постоянная Ридберга	$R_{\pi \infty}$	$R_{\pi \infty} = \frac{R_{\pi \infty 0}}{\kappa_{\pi R}}$	см <sup>-1</sup>
4	длина волны Комптона	$\lambda_{\pi C}$	$\lambda_{\pi C} = 2 \cdot \pi^2 \cdot \alpha_{\pi}^2 / R_{\pi \infty}$	см
5	радиус Бора	$a_{\pi 0}$	$a_{\pi 0} = \frac{\alpha_{\pi}}{2 \cdot R_{\pi \infty 0}}$	см
6	масса электрона*	$m_{\pi e}$	$m_{\pi e} = \pi^2 \cdot f_{\pi s}^3 \cdot \rho_{\pi Se} \cdot \lambda_{\pi C}^2$	г
7	квант циркуляции	$q_{\pi c}$	$q_{\pi c} = \lambda_{\pi C} \cdot c$	см <sup>2</sup> с <sup>-1</sup>
8	постоянная Планка	$h_{\pi}$	$h_{\pi} = m_{\pi e} \cdot q_{\pi c}$	г см <sup>2</sup> с <sup>-1</sup>
9	элементарный заряд	$e_{\pi}$	$e_{\pi} = (\pm \sqrt{\alpha_{\pi}}) \cdot \sqrt{h_{\pi} \cdot c}$	г <sup>-1/2</sup> см <sup>3/2</sup> с <sup>-1</sup>
10	коэффициент отношения элементарного заряда к массе электрона	$k_{e/m}$	$k_{e/m} = \frac{-e_{\pi}}{m_{\pi e}}$	г <sup>-3/2</sup> см <sup>3/2</sup> с <sup>-1</sup>
11	постоянная Ридберга для атома протия	$R_{\pi H}$	$R_{\pi H} = \frac{R_{\pi \infty}}{1 + r_{\pi ep}}$	см <sup>-1</sup>
12	масса протона	$m_{\pi p}$	$m_{\pi p} = \frac{m_{\pi e}}{r_{ep}}$	г
13	Комптоновская длина волны протона	$\lambda_{\pi C,p}$	$\lambda_{\pi C,p} = r_{ep} \cdot \lambda_{\pi C}$	см
14	масса нейтрона	$m_{\pi n}$	$m_{\pi n} = \frac{m_{\pi e}}{r_{en}}$	г
15	Комптоновская длина волны нейтрона	$\lambda_{\pi C,n}$	$\lambda_{\pi C,n} = r_{en} \cdot \lambda_{\pi C}$	см
16	атомная единица массы (1 а.е.м.)	$m_{\pi u}$	$m_{\pi u} = \frac{r_{\pi \mu, pn}^2}{\sqrt[3]{\pi^2}} \cdot \left( \frac{1 + r_{\pi ep}}{r_{\pi pn}} \right) \cdot \left( \frac{f_{\pi s 0}}{f_{\pi s}} \right)^4 \cdot m_{\pi p}$	г
17	молярная постоянная Планка	$h_{\pi M}$	$h_{\pi M} = \frac{h_{\pi}}{m_{\pi u}}$	см <sup>2</sup> с <sup>-1</sup>
18	постоянная Фарадея	$F_{\pi}$	$F_{\pi} = \frac{e_{\pi}}{m_{\pi u}}$	г <sup>-3/2</sup> см <sup>3/2</sup> с <sup>-1</sup>
19	постоянная Джозефсона	$K_{J\pi}$	$K_{J\pi} = \frac{2 \cdot e_{\pi}}{h_{\pi}}$	г <sup>-3/2</sup> см <sup>-1/2</sup>
20	постоянная фон Клитцинга	$R_{K\pi}$	$R_{K\pi} = \frac{h_{\pi}}{e_{\pi}^2}$	г <sup>2</sup> см <sup>-1</sup> с
21	длина Планка	$l_{\pi P}$	$l_{\pi P} = \psi_{\pi} \cdot \lambda_{\pi C}$	см
22	время Планка	$t_{\pi P}$	$t_{\pi P} = \frac{l_{\pi P}}{c}$	с

№	Наименование параметра	Символ	Расчетная формула	Ед. СГС
23	масса Планка	$m_{\pi P}$	$m_{\pi P} = \frac{m_{\pi e}}{\psi_{\pi}}$	г
24	постоянная тяготения Ньютона	$G_{\pi}$	$G_{\pi} = \frac{h_{\pi} \cdot c}{m_{\pi P}^2}$	$\Gamma^{-1} \text{ см}^3 \text{ с}^{-2}$

\* – в Пи-Теории поверхностная плотность массы электрона  $\rho_{\pi Se}$  равна единичной массовой поверхностной плотности  $\rho_{\pi Su} = 1,0 \left[ \Gamma \cdot \text{см}^{-2} \right]$  Унитарной системы единиц:  $l_{\pi u} = 1,0 \text{ [см]}$ ,  $m_{\pi u} = 1,0 \text{ [г]}$ ,  $t_{\pi u} = 1,0 \text{ [с]}$ .

**Таблица 4.** Представлены результаты расчетов размерных ФФК в полном соответствии Таблице 3. Используются значения: постоянная Ридберга  $R_{\infty} = 1,097\ 373\ 156\ 8539(55) \cdot 10^5 \left[ \text{см}^{-1} \right]$  (CODATA 2010); скорость света  $c = 2,99792458 \cdot 10^{10} \left[ \text{см} \cdot \text{с}^{-1} \right]$ .

№	Наименование параметра	Символ	Численное значение (СГС)	Ед. СГС
1	длина волны Комптона	$\lambda_{\pi C0}$	$2,397\ 686\ 311\ 973\ 620 \times 10^{-10}$	см
2	постоянная Ридберга	$R_{\pi e0}$	$1,110\ 473\ 757\ 591\ 524 \times 10^5$	$\text{см}^{-1}$
	Коэффициент согласования	$\kappa_{\pi R}$	1,011 938 145 7946	-
3	постоянная Ридберга	$\bar{R}_{\infty}$	$1,097\ 373\ 156\ 8539 \times 10^5$	$\text{см}^{-1}$
4	длина волны Комптона	$\lambda_{\pi C}$	$2,426\ 310\ 240\ 7357 \times 10^{-10}$	см
5	радиус Бора	$a_{\pi 0}$	$5,291\ 772\ 111\ 1867 \times 10^{-9}$	см
6	масса электрона	$m_{\pi e}$	$9,109\ 382\ 325\ 3402 \times 10^{-28}$	г
7	квант циркуляции	$q_{\pi c}$	7,273 895 109 4073	$\text{см}^2 \text{ с}^{-1}$
8	постоянная Планка	$h_{\pi}$	$6,626\ 069\ 154\ 6014 \times 10^{-27}$	$\Gamma \text{ см}^2 \text{ с}^{-1}$
9	элементарный заряд	$e_{\pi}$	$4,803\ 204\ 354\ 1649 \times 10^{-10}$	$\Gamma^{-1/2} \text{ см}^{3/2} \text{ с}^{-1}$
10	коэффициент отношения элементарного заряда к массе электрона	$k_{e/m}$	$-5,272\ 810\ 145\ 2098 \times 10^{17}$	$\Gamma^{-3/2} \text{ см}^{3/2} \text{ с}^{-1}$
11	постоянная Ридберга для атома протия	$R_{\pi H}$	$1,096\ 775\ 834\ 0655 \times 10^5$	$\text{см}^{-1}$
12	масса протона	$m_{\pi p}$	$1,672\ 621\ 669\ 8229 \times 10^{-24}$	г
13	Комптоновская длина волны протона	$\lambda_{\pi C,p}$	$1,321\ 409\ 857\ 4420 \times 10^{-13}$	см
14	масса нейтрона	$m_{\pi n}$	$1,674\ 927\ 243\ 9581 \times 10^{-24}$	г
15	Комптоновская длина волны нейтрона	$\lambda_{\pi C,n}$	$1,319\ 590\ 907\ 7531 \times 10^{-13}$	см
16	атомная единица массы (1 а.е.м.)	$m_{\pi u}$	$1,660\ 539\ 062\ 8310 \times 10^{-24}$	г
17	молярная постоянная Планка	$h_{\pi M}$	$3,990\ 312\ 123\ 8863 \times 10^{-3}$	$\text{см}^2 \text{ с}^{-1}$
18	постоянная Фарадея	$F_{\pi}$	$2,892\ 557\ 279\ 5476 \times 10^{14}$	$\Gamma^{-3/2} \text{ см}^{3/2} \text{ с}^{-1}$
19	постоянная Джозефсона	$K_{J\pi}$	$1,449\ 789\ 986\ 2181 \times 10^{17}$	$\Gamma^{-3/2} \text{ см}^{-1/2}$
20	постоянная фон Клитцинга	$R_{K\pi}$	$2,872\ 062\ 163\ 8102 \times 10^{-8}$	$\Gamma^2 \text{ см}^{-1} \text{ с}$
21	интервал длины Планка	$l_{\pi P}$	$4,051\ 071\ 501\ 4798 \times 10^{-33}$	см
22	интервал времени Планка	$t_{\pi P}$	$1,351\ 291\ 999\ 9741 \times 10^{-43}$	с
23	интервал массы Планка	$m_{\pi P}$	$5,455\ 886\ 822\ 7026 \times 10^{-5}$	г
24	постоянная тяготения Ньютона	$G_{\pi}$	$6,673\ 381\ 632\ 9142 \times 10^{-8}$	$\Gamma^{-1} \text{ см}^3 \text{ с}^{-2}$

В Таблице 5 приведено сравнение данных CODATA 2010 с теоретическими расчетами Пи-Теории.

**Таблица 5.** В соответствии с перечнем параметров из таблиц 1 и 3 приведены: значения ФФК рекомендованные CODATA (2010) для международного использования – из публикации на сайте NIST по адресу <http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>; результаты расчетов из таблиц 2 и 4; результаты сравнения данных (столбец 6),  $\delta_r$  – относительная неопределенность.

Параметр $a$ (CODATA)	Численное значение, СГС (CODATA 2010)	Относительная погрешность	Параметр $a^*$ (Пи-Теория)	Численное значение, СГС (Пи-Теория)	$\delta_r = \frac{a^* - \bar{a}}{a^*}$
1	2	3	4	5	6
$\alpha$	$7,297\ 352\ 5698(24) \times 10^{-3}$	$3,2 \times 10^{-10}$	$\alpha_\pi \cdot 2\pi$	$7,297\ 352\ 572\ 519\ 857 \times 10^{-3}$	$3,7 \times 10^{-10}$
$a_e$	$1,159\ 652\ 180\ 76(27) \times 10^{-3}$	$2,3 \times 10^{-10}$	$a_{\pi e}$	$1,159\ 652\ 180\ 787\ 572 \times 10^{-3}$	$0,2 \times 10^{-10}$
$a_\mu$	$1,165\ 920\ 91(63) \times 10^{-3}$	$5,4 \times 10^{-7}$	$a_{\pi\mu}$	$1,165\ 920\ 932\ 325\ 338 \times 10^{-3}$	$0,2 \times 10^{-7}$
$m_e / m_p$	$5,446\ 170\ 2178(22) \times 10^{-4}$	$4,1 \times 10^{-10}$	$r_{\pi ep}$	$5,446\ 170\ 218\ 699\ 091 \times 10^{-4}$	$1,7 \times 10^{-10}$
$m_e / m_n$	$5,438\ 673\ 4461(32) \times 10^{-4}$	$5,8 \times 10^{-10}$	$r_{\pi en}$	$5,438\ 673\ 445\ 786\ 832 \times 10^{-4}$	$-0,6 \times 10^{-10}$
$m_n / m_p$	$1,001\ 378\ 419\ 17(45)$	$4,5 \times 10^{-10}$	$r_{\pi np}$	$1,001\ 378\ 419\ 386\ 085$	$2,2 \times 10^{-10}$
$\mu_p / \mu_n$	$-1,459\ 898\ 06(34)$	$2,4 \times 10^{-7}$	$r_{\pi\mu, pn}$	$-1,459\ 898\ 124\ 622\ 978$	$0,4 \times 10^{-7}$
$R_\infty$	$1,097\ 373\ 156\ 8539(55) \times 10^5$	$5,0 \times 10^{-12}$	$R_{\pi\infty}$	$1,097\ 373\ 156\ 8539 \times 10^5$	0,0
$\lambda_C$	$2,426\ 310\ 2389(16) \times 10^{-10}$	$6,5 \times 10^{-10}$	$\lambda_{\pi C}$	$2,426\ 310\ 240\ 7357 \times 10^{-10}$	$7,6 \times 10^{-10}$
$a_0$	$0,529\ 177\ 210\ 92(17) \times 10^{-8}$	$3,2 \times 10^{-10}$	$a_{\pi 0}$	$0,529\ 177\ 211\ 1187 \times 10^{-8}$	$3,8 \times 10^{-10}$
$m_e$	$9,109\ 382\ 91(40) \times 10^{-28}$	$4,4 \times 10^{-8}$	$m_{\pi e}$	$9,109\ 382\ 325\ 3402 \times 10^{-28}$	$-6,4 \times 10^{-8}$
$h / m_e$	$7,273\ 895\ 1040(47)$	$6,5 \times 10^{-10}$	$q_{\pi c}$	$7,273\ 895\ 109\ 4073$	$7,4 \times 10^{-10}$
$m_p$	$1,672\ 621\ 777(74) \times 10^{-24}$	$4,4 \times 10^{-8}$	$m_{\pi p}$	$1,672\ 621\ 669\ 8229 \times 10^{-24}$	$-6,4 \times 10^{-8}$
$m_n$	$1,674\ 927\ 351(74) \times 10^{-24}$	$4,4 \times 10^{-8}$	$m_{\pi n}$	$1,674\ 927\ 243\ 9581 \times 10^{-24}$	$-6,4 \times 10^{-8}$
$\lambda_{C,p}$	$1,321\ 409\ 856\ 23(94) \times 10^{-13}$	$7,1 \times 10^{-10}$	$\lambda_{\pi C,p}$	$1,321\ 409\ 857\ 4420 \times 10^{-13}$	$9,2 \times 10^{-10}$
$\lambda_{C,n}$	$1,319\ 590\ 9068(11) \times 10^{-13}$	$8,2 \times 10^{-10}$	$\lambda_{\pi C,n}$	$1,319\ 590\ 907\ 7531 \times 10^{-13}$	$7,2 \times 10^{-10}$
$m_u$	$1,660\ 538\ 921(73) \times 10^{-24}$	$4,4 \times 10^{-8}$	$m_{\pi u}$	$1,660\ 539\ 062\ 8310 \times 10^{-24}$	$8,5 \times 10^{-8}$
$l_p$	$1,616\ 199(97) \times 10^{-33}$	$6,0 \times 10^{-5}$	$l_{\pi p} / \sqrt{2\pi}$	$1,616\ 143\ 702\ 8696 \times 10^{-33}$	$-3,4 \times 10^{-5}$
$t_p$	$5,391\ 06(32) \times 10^{-44}$	$6,0 \times 10^{-5}$	$t_{\pi p} / \sqrt{2\pi}$	$5,390\ 875\ 119\ 5788 \times 10^{-44}$	$-3,4 \times 10^{-5}$
$m_p$	$2,176\ 51(13) \times 10^{-5}$	$6,0 \times 10^{-5}$	$m_{\pi p} / \sqrt{2\pi}$	$2,176\ 583\ 930\ 6611 \times 10^{-5}$	$3,4 \times 10^{-5}$
$h$	$6,626\ 069\ 57(29) \times 10^{-27}$	$4,4 \times 10^{-8}$	$h_\pi$	$6,626\ 069\ 154\ 6014 \times 10^{-27}$	$-6,3 \times 10^{-8}$
$G$	$6,673\ 84(80) \times 10^{-8}$	$1,2 \times 10^{-4}$	$G_\pi$	$6,673\ 381\ 632\ 9142 \times 10^{-8}$	$-0,7 \times 10^{-4}$