Диагностика, лечение и профилактика оксиуроза в условиях ЛКК ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Фирсов Г.М. доцент ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Петров А.А. студент 5 курса ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ

Коневодство является, вероятно, самой древнейшей из отраслей животноводства. По данным ряда отечественных и зарубежных исследователей в странах Европы и Азии оно зародилось примерно в IV в. д.н.э.

Антропологические и археологические исследования доказывают, что лошадь была одомашнена очень рано в регионе вокруг Каспийского моря. [1]

На территории России коневодство зародилось во времена древних поселений – скифов, у которых конь был главным источником мяса, молока, тягловой силы, кожи, а также транспортным средством для армии.

Главной задачей коневодства является дальнейшее увеличение поголовья лошадей, повышение продуктивности и снижение себестоимости. Выполнение этой задачи наряду с широким развитием прочной кормовой базы тесно связано с проведением ветеринарных мероприятий по ликвидации потерь животных от различных болезней, в частности, вызываемых гельминтами. [2]

Существует значительное количество отечественных и зарубежных исследований, посвященных наиболее распространенным гельминтозам лошадей: параскаридозу, оксиурозу, делафондиозу, стронгилезу, альфортиозу, трихонематидозу. Наибольшее количество работ по гельминтозам лошадей опубликовано в 1930-1970 годы и последние 10 лет. Это связано с периодами бурного развития коневодства в СССР и в последние годы в Российской Федерации. [2]

Распространенным гельминтозом является оксиуроз лошадей – заболевание, вызываемое паразитированием нематоды из подотряда *Oxyurata*

Skrjabin, 1923. У лошадиных паразитируют представители двух семейств Oxyuridae Cobbold, 1864 и Cosmocercidae Travassos, 1925. Оксиуроз лошадей, вызываемый *Oxyuris equi* (Schrank, 1781), имеет широкое распространение на территории Российской Федерации и стран СНГ.

Наиболее полные данные о заболевании оксиурозом лошадей получены 50-й Союзной гельминтологической экспедицией в Сибири (К.И.Скрябин, Р.С.Шульц, 1929). Методом полного гельминтологического вскрытия обнаружена поголовная инвазированность их оксиурами.

О широком распространении оксиуроза лошадей сообщали: в Кировской области - В.С.Ершов (1929), Оренбургской области - М.А.Палимпсестов (1937), Воронежской области - Б.С.Москалев (1937), Татарии - А.В.Ефимов (1933, 1946).

Литературные источники:

1. <http://www.fao.org/3/a-i1687r/i1687r07.pdf>
2. Эпизоотология и терапия основных гельминтозов лошадей в Нижнем Поволжье Худов, Геннадий Николаевич Диссерт. на соиск. ученой степени кандид. ветеринарных н.– 03.00.19 – Саратов, 2002 – 116 с.